

酒精及对照饲料配置表 (单位: g)					
	L10016A	水	麦芽糊精	无水乙醇 (可以用95%乙醇代替, 相应减少水的添加量)	合计
5%酒精饲料-L10016	132.18	817.82	0	50	1000
4%酒精饲料	132.18	809.9	17.92	40	1000
3%酒精饲料	132.18	801.98	35.84	30	1000
2%酒精饲料	132.18	794.06	53.76	20	1000
1%酒精饲料	132.18	786.14	71.68	10	1000
对照饲料-L10015	132.18	778.22	89.6	0	1000

酒精饲料L10016混合方法(低浓度酒精饲料如跟实验无关可忽略, 配置方法相同) :

- 1, 将干混料产品L10016A (528.72克/4升) 加入搅拌机容器中。
- 2, 向容器中注入3271.28毫升冷水 (4摄氏度)。
- 3, 向容器中添加200克无水乙醇 (客户自备)。
- 4, 低速搅拌20-30秒。
- 5, 分配到各个饲喂瓶。

对照饲料L10015混合方法:

- 1, 称取358.4克麦芽糊精。
- 2, 将1/3干混料产品L10016A (528.72克/4升) 和1/3麦芽糊精倒入带盖容器中。
- 3, 量3112.88克温水。向容器中注入1/3温水, 用力摇晃30秒。
- 4, 向容器中添加1/3干混料, 1/3麦芽糊精, 1/3温水, 然后用力摇晃30秒。
- 5, 向容器中添加剩余的1/3干混料, 1/3麦芽糊精, 1/3温水, 然后用力摇晃30秒。
- 6, 分配到各个饲喂瓶。

注意事项:

- 1, 实验室如果没有相应的搅拌机, 可以按配方比例随配随用, 把混合物装入密闭容器用力摇晃一分钟, 使之充分混合。
- 2, 准备好的食物应冷藏保存, 并应在3天内使用完毕。准备好的食物在室温下的保存时间不应超过48小时, 以防止食物变质。
- 3, 如果前一天已准备好饮食, 在分配前将瓶子倒置几次, 以重新悬浮颗粒, 有些颗粒可能已经沉淀 (SPF级的饮食更容易出现这个问题)。
- 4, 建议使用专用的液体饲料饲喂瓶喂食液态食物, 因为标准饮水器瓶子可能会被微粒堵塞。
- 5, 填充液体饮食喂食瓶时, 请将拇指按紧动物取食口, 并从顶部注入液体饮食。在拧紧盖子的同时, 拇指不能松开, 要一直放在取料口上, 并倒置瓶子以释放任何残留的气泡。然后将饲喂瓶固定到支架放入笼中。
- 6, 在3-5天的时间里, 逐步增加液体饲料的量, 同时减少固体食物的量, 以使动物适应环境。酒精饲料需要额外的适应时间。

Day 1-3 饲喂1/3 酒精饲料 2/3 普通颗粒饲料
 Day 4-7 饲喂2/3酒精饲料 1/3 普通颗粒饲料
 Day 8 饲喂酒精饲料, 移除普通颗粒饲料

动物参考摄食量:

小鼠平均每天消耗20-30毫升的液体食物。大鼠平均每天消耗80-100毫升液体饲料。摄取量随动物的大小和性别而变化。