

# 赖氨酸(lysine, Lys)含量测定试剂盒说明书

分光光度法 50 管/48 样

**注 意：** 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

**测定意义：**

赖氨酸是人体必需氨基酸之一，能促进人体发育、增强免疫功能，并有提高中枢神经组织功能的作用。赖氨酸为碱性必需氨基酸。由于谷物食品中的赖氨酸含量甚低，且在加工过程中易被破坏而缺乏，故称为第一限制性氨基酸。

**测定原理：**

蛋白质中的赖氨酸具有一个游离的  $\epsilon$ -NH<sub>2</sub>，它与茚三酮试剂反应生成蓝紫色物质，其颜色的深浅在一定范围内与赖氨酸的含量成线性关系。亮氨酸与赖氨酸的碳原子数目相同，而且仅有一个游离氨基( $\epsilon$ -NH<sub>2</sub>)，所以通常用亮氨酸配制标准液。

**需自备的仪器和用品：**

可见分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰、蒸馏水、水浴锅。

**试剂的组成和配制：**

提取液：液体 50mL×1 瓶，4°C 保存；

试剂一：粉剂×1 瓶，4°C 保存；临用前加入 12.5mL 试剂三充分溶解混匀；

试剂二：液体 12.5mL×1 瓶，4°C 保存；

试剂三：液体 15mL×1 瓶，4°C 保存；

试剂四：60% 乙醇，自备。

**赖氨酸提取：**

样本烘干粉碎，称取约 0.01g 样本，加入 1mL 提取液，充分匀浆。80°C 水浴提取 20min，冷却后 10000g 离心 10min，取上清待测。

**测定步骤**

- 1、 分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 570nm，蒸馏水调零。
- 2、 工作液的配制：取 10mL 试剂一与 10mL 试剂二混合摇匀，取上清备用。用不完的试剂 4°C 保存。
- 3、 在有盖 EP 管中加入下列试剂：

试剂名称 (μL)	测定管	空白管
样本	200	
提取液		200
工作液	400	400

混匀，80°C水浴 30min (盖紧，以防止水分散失)，冷却至常温。

试剂四	600	600
-----	-----	-----

混匀，取 1000μL 至 1mL 玻璃比色皿中，于 530nm 波长处记录吸光值 A。△A=A 测定管-A 空白管。空白管只要做一管。

**赖氨酸含量计算：**

标准条件下测定回归方程为  $y = 0.0062x - 0.0212$ ; x 为赖氨酸含量 (μg/mL)，y 为吸光值。

**1. 按照蛋白浓度计算**

$$\begin{aligned}\text{赖氨酸含量}(\mu\text{g}/\text{mg prot}) &= [(\Delta A + 0.0212) \div 0.0062 \times V1] \div (Cpr \times V1) \times 1.1515 \\ &= 185.73 \times (\Delta A + 0.0212) \div Cpr\end{aligned}$$

**2. 按照样本质量计算**

$$\begin{aligned}\text{赖氨酸含量}(\mu\text{g}/\text{g 干重}) &= [(\Delta A + 0.0212) \div 0.0062 \times V1] \div (W \times V1 \div V2) \times 1.1515 \\ &= 185.73 \times (\Delta A + 0.0212) \div W\end{aligned}$$

V1：加入反应体系中样本体积，0.2mL；V2：加入提取液体积，1 mL；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g；1.1515，校正系数。

Lifemall.asia  
To be with you