

## 吲哚乙酸氧化酶活性测定试剂盒说明书

微量法 100T/96S

**注 意：**正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

**测定意义：**

吲哚乙酸（IAA）在吲哚乙酸氧化酶的作用下，被氧化破坏失去活性。植物体内吲哚乙酸氧化酶活力的大小，对调节体内吲哚乙酸的水平，起着重要的作用，而影响植物的生长。

**测定原理：**

在无机酸存在情况下，吲哚乙酸能与  $\text{FeCl}_3$  作用，生成红色螯合物，该物质在 530nm 处有最大吸收峰，酶活力的大小可以其破坏吲哚乙酸的速度表示之。吲哚乙酸的含量可用比色法测定。

**自备仪器和用品：**

低温离心机、水浴锅、可调节移液器、可见分光光度计/酶标仪、1.5mL 离心管、微量玻璃比色皿/96 孔板、和蒸馏水。

**试剂组成和配制：**

试剂一：液体 120mL×1 瓶，4℃保存。

试剂二：液体 10mL×1 瓶，4℃保存。

试剂三：液体 10mL×1 瓶，4℃保存。

试剂四：液体 10mL×1 瓶，4℃保存。

试剂五：液体 2mL×1 瓶，4℃避光保存。

试剂六：液体 50mL×1 瓶，4℃保存。临用前吸取 1mL 试剂五加入试剂六中混匀，待用，避光保存

**粗酶液提取：**

1. 组织：按照组织质量（g）：试剂一体积（mL）为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 试剂一）进行冰浴匀浆。8000g，4℃离心 10min，取上清置冰上待测。
2. 细菌、真菌：按照细胞数量（ $10^4$  个）：试剂一体积（mL）为 500~1000：1 的比例（建议 500 万细胞加入 1mL 试剂一），冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；然后 8000g，4℃，离心 10min，取上清置于冰上待测。
3. 血清等液体：直接测定。

**测定操作：**

1. 分光光度计/酶标仪预热 30min，调节波长到 530 nm，蒸馏水调零。
2. 试剂二、试剂三、试剂四置于 25°C（一般物种）或者 37°C（哺乳动物）水浴中保温 20min。
3. 取 1.5mL EP 管若干，按操作依次加入试剂，操作表如下：

	标准管	测定管
试剂二（ $\mu\text{L}$ ）	20	20
试剂三（ $\mu\text{L}$ ）	20	20
试剂四（ $\mu\text{L}$ ）	40	40
样本上清液（ $\mu\text{L}$ ）	0	20
试剂一（ $\mu\text{L}$ ）	120	100
充分混匀后置于 30°恒温水浴中，保温反应 30min。		
实际六（ $\mu\text{L}$ ）	400	400
充分混匀，置于 30°C 黑暗水浴保温显色 30min。取 200 $\mu\text{L}$ 显色后呈红色的反应液于微量玻璃比色皿/96 孔板中，用分光光度计或酶标仪中测定波长 530nm 处 OD 值，标准管记为 A1，测定管记为 A2		

**注意：**标准管只需做一次

**IAA 氧化酶活性计算公式：**
**a. 使用微量石英比色皿测定的计算公式如下**

IAA 标准曲线公式： $y = 1.334x + 0.025$   $R^2 = 0.998$ （x 为 IAA 浓度，mmol/L；y 为吸光值）

**(1) 按蛋白浓度计算**

酶活定义：从开始时加入的 IAA 量减去酶作用后残留的 IAA 含量，即得被酶所催化的 IAA 含量。以每 mg 酶蛋白在 1h 内分解破坏的吲哚乙酸量表示酶活力大小。

$$U (\mu\text{mol/h/mg prot}) = [(A1-0.025) \div 1.334 - (A2-0.025) \div 1.334] \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T$$

$$= 1.5 \times (A1 - A2) \div C_{\text{pr}}$$

**(2) 按样本鲜重计算**

酶活定义：以每 g 样本在 1h 内分解破坏的吲哚乙酸量表示酶活力大小。

$$U (\mu\text{mol/h/g 鲜重}) = [(A1-0.025) \div 1.334 - (A2-0.025) \div 1.334] \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) \div T$$

$$= 1.5 \times (A1 - A2) \div W$$

**(3) 按细胞数量计算**

酶活定义：以每 1 万个细胞在 1h 内分解破坏的吲哚乙酸量表示酶活力大小。

$$U (\mu\text{mol/h}/10^4 \text{ cell}) = [(A1-0.025) \div 1.334 - (A2-0.025) \div 1.334] \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) \div T$$

$$= 1.5 \times (A1 - A2) \div \text{细胞数量}$$

**(4) 按液体体积计算**

酶活定义：以每 mL 酶液在 1h 内分解破坏的吲哚乙酸量表示酶活力大小。

$$U (\mu\text{mol/h/mL}) = [(A1-0.025) \div 1.334 - (A2-0.025) \div 1.334] \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T$$

$$= 1.5 \times (A1 - A2)$$

V 样总：上清液总体积，1mL；V 样：加入反应体系中上清液体积，20 $\mu\text{L}$ =0.02 mL；Cpr：上清液蛋白质浓度，mg/mL；W：样品质量，g，T：反应时间，0.5h。

**b.使用 96 孔板测定的计算公式如下**

IAA 标准曲线公式:  $y = 0.667x + 0.025$   $R^2 = 0.998$  (x 为 IAA 浓度, mmol/L; y 为吸光值)

**(1) 按蛋白浓度计算**

酶活定义: 从开始时加入的 IAA 量减去酶作用后残留的 IAA 含量, 即得被酶所催化的 IAA 含量。以每 mg 酶蛋白在 1h 内分解破坏的吲哚乙酸量表示酶活力大小。

$$U (\mu\text{mol/h/mg prot}) = [(A1-0.025) \div 0.667 - (A2-0.025) \div 0.667] \times V \text{ 样} \div (V \text{ 样} \times Cpr) \div T \\ = 3 \times (A1-A2) \div Cpr$$

**(2) 按样本鲜重计算**

酶活定义: 以每 g 样本在 1h 内分解破坏的吲哚乙酸量表示酶活力大小。

$$U (\mu\text{mol/h/g 鲜重}) = [(A1-0.025) \div 0.667 - (A2-0.025) \div 0.667] \times V \text{ 样} \div (V \text{ 样} \div V \text{ 样总} \times W) \div T \\ = 3 \times (A1-A2) \div W$$

**(3) 按细胞数量计算**

酶活定义: 以每 1 万个细胞在 1h 内分解破坏的吲哚乙酸量表示酶活力大小。

$$U (\mu\text{mol/h}/10^4 \text{ cell}) = [(A1-0.025) \div 0.667 - (A2-0.025) \div 0.667] \times V \text{ 样} \div (V \text{ 样} \div V \text{ 样总} \times W) \div T \\ = 3 \times (A1-A2) \div \text{细胞数量}$$

**(4) 按液体体积计算**

酶活定义: 以每 mL 酶液在 1h 内分解破坏的吲哚乙酸量表示酶活力大小。

$$U (\mu\text{mol/h/mL}) = [(A1-0.025) \div 0.667 - (A2-0.025) \div 0.667] \times V \text{ 样} \div (V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \div T \\ = 3 \times (A1-A2)$$

V 样总: 上清液总体积, 1mL; V 样: 加入反应体系中上清液体积, 20 $\mu$ L=0.02 mL; Cpr: 上清液蛋白质浓度, mg/mL; W: 样品质量, g, T: 反应时间, 0.5h。

**注意事项:**

最低检出限为 0.01 $\mu$ mol/mL。

Lifemall.asia

To be with you